

Änderungen in der E 1

Stand: 01.01.2007

In der E 1 vom 01.01.2006 sind wörtlich zu ersetzen (Änderungen gegenüber dem Stand vom 01.01.2006 sind **fett und kursiv** gedruckt):

Seite 1 (zu Allgemeine Hinweise):

Die Zustimmung gilt als gegeben für den monovalenten Masern-Impfstoff "Moraten®" (Berna Biotech) bei allergologisch abgesicherter klinisch relevanter Hühnereiweißallergie, **für die monovalenten Hib-Impfstoffe "Act-Hib®" (Sanofi Pasteur MSD), "Hiberix®" (GSK) und "Vaxem Hib®" (Chiron S. r. I.) bei Vorliegen einer Indikation gemäß Tabelle 3 der E 1** und für intrakutanen BCG-Impfstoff "Vaccin BCG Pasteur® intradermique" (Pasteur MSD SNC) bei Vorliegen einer Indikation gemäß Tabelle 3 der E 1 oder im Sinne der Biostoffverordnung.

Seite 3 Synopsis-Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freistaat Sachsen, Stand 01.01.2006:

Synopsis- Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freistaat Sachsen
Stand: 01.01.2007

Impfstoff	Geburt	3. Mon. ¹	4. Mon. ¹	5. Mon. ¹	13. Mon. ¹	24. Mon. ¹	6. Lbj. ¹	10. Lbj. ¹	11. Lbj. ¹	18. Lbj. ¹	alle 10 Jahre	über 50 Jahre	über 60 Jahre	
Hepatitis B (HBV) ^{3,6}		HBV 1 / HBV 2 ^{3,6}			HBV 3/4 ³ oder HAV / HBV ⁶									
Diphtherie, Pertussis, Tetanus ^{2,3,4}		1. DTPa	2. DTPa	3. DTPa	4. DTPa		5. DTPa oder Tdpa ⁴		Tdpa		Tdpa			
Haemophilus influenzae Typ b ^{2,3}		1. Hib	3	2. Hib	3. Hib									
Polio ^{2,3}		1. IPV triv.	3	2. IPV triv.	3. IPV triv.				4. IPV triv.		IPV triv.			
Masern, Mumps, Röteln					1. MMR		2. MMR							
Varizellen ⁵					Varizellen				Varizellen					
Meningokokken C ⁷		Meningokokken (Gruppe C) ⁷												
Influenza												jährlich		
Pneumokokken ⁸		Pneumokokken											alle 6 Jahre	

¹ Zeitangabedefinition: Es bedeuten z.B.: 3. Monat = ab 3. Mon. = vollendeter 2. Monat; 6. Lbj. = ab 5. Geburtstag

² Abstände zwischen den Impfungen 1-3 bzw. 1 und 2 mindestens 4 Wochen,

zwischen der 3. und 4. bzw. 2. und 3. Impfung zur Vervollständigung der Grundimmunisierung mindestens 6 Monate

³ bei Antigenkombinationen, die eine Pertussiskomponente enthalten, sind 3 Injektionen im Säuglingsalter erforderlich

⁴ ab 6. Lbj. Fachinformation zu den Impfstoffen wegen Altersbegrenzung hinsichtlich reduzierten Di-Toxoid-Gehalts beachten

⁵ alle ungeimpften Kinder/Jugendlichen mit negativer Varizellenanamnese; bis 13. Lbj. 1 Dosis, ab 14. Lbj. 2 Dosen erforderlich

⁶ Kombinationsimpfung HAV/HBV empfohlen, falls Grundimmunisierung gegen HBV nicht im Säuglingsalter begonnen wurde. Impfung im Säuglingsalter hat Priorität!

⁷ Im 1. Lbj. 2 oder 3 Injektionen (Herstellerrangabe beachten), ab 2. Lbj. 1 Injektion. Bei Impfung im Säuglingsalter wird eine Boosterung ab 2. Lebensjahr empfohlen.

⁸ Die Standardimpfung wird bis zum 24. Lebensmonat entsprechend dem jeweiligen Immunisierungsschema mit Konjugatimpfstoff empfohlen, bei Kindern nach dem 24. Lebensmonat sind nur Indikationsimpfungen empfohlen.

**Tabelle 1: Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
A: Nach dem Lebensalter geordnet**

Lebensalter Seite 6	Impfung gegen	Anmerkung (Packungsbeilage/ Fachinformationen beachten)
Alle 10 Jahre	Tetanus-Diphtherie (Auffrischimpfung)	Alle Personen; kann bei Nachweis schützender Antikörper modifiziert werden.
	<i>Pertussis</i> (Auffrischimpfung)	Alle Personen.
	Poliomyelitis (Auffrischimpfung) Tetravalente Kombinationsimpfstoffe Tdpa-IPV verwenden.	Alle Personen. kann bei Nachweis schützender Antikörper modifiziert werden.

**Tabelle 2: Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
B: Nach Impfung geordnet**

Impfung gegen Seite 7	Lebensalter	Impfstoffe	Anmerkung (Packungsbeilage/ Fachinformationen beachten)
Diphtherie-Tetanus- Pertussis (Auffrischimpfung)	Ab 11. Lebensjahr.	Kombinationsimpfstoffe Tdpa oder Tdpa-IPV verwenden.	Alle Kinder und Jugendlichen. Der Abstand zur 1. Auffrischimpfung sollte nicht kürzer als 5 Jahre sein.
Diphtherie-Tetanus- Pertussis (Weitere Auffrischimpfungen)	Alle 10 Jahre.	Kombinationsimpfstoffe Tdpa-IPV verwenden	Alle Personen; kann bei Nachweis schützender Antikörper modifiziert werden.

Tabelle 3: Indikationsimpfungen einschließlich Reiseimpfungen

Kate- gorie	Impfung gegen	Indikation bzw. Reiseziele	Anmerkung (Packungsbeilage/ Fachinformationen beachten)
Seite 12 / 13			
S B I R	Hepatitis B	(unverändert)	Hepatitis-B-Impfung nach den Angaben des Herstellers; im Allgemeinen nach serologischer Vortestung bei den Indikationen 1.-7.; Kontrolle des Impferfolges ist nach Indikationsimpfungen prä- oder postexpositionell, bei allen Immunsupprimierten und für alle Personen über 18 Jahre (1-2 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung) erforderlich. Auffrischimpfung entsprechend ... (unverändert)
Seite 17			
S	Pertussis	Alle Kinder und Jugendlichen gemäß Impfkalender Seite 3; Erwachsene: Boosterung alle 10 Jahre.	(unverändert)

P	Pertussis (Fortsetzung)	Kontaktpersonen im Rahmen des sächsischen Herdbekämpfungsprogrammes. Postexpositionelle Impfung (je nach Impfstatus und Alter): <ul style="list-style-type: none">- Beginn, Weiterführung bzw. Vervollständigung der Grundimmunisierung (Kinder/Jugendliche) bzw.- ggf. 5. oder 6. Pertussisinjektion gemäß Impfkalender bzw.- 1 Injektion bei vollst. immunisierten Erwachsenen (Booster), wenn die letzte Impfung länger als 5 Jahre zurückliegt, oder bei unvollständig immunisierten Erwachsenen oder bei Erwachsenen mit unbekanntem Impfstatus.	(unverändert)
---	----------------------------	--	---------------
